


Las soluciones cristaloides balanceadas, ¿reducen el riesgo de función retrasada del injerto en receptores de trasplante renal de donante cadáver?

Resumen gráfico: **Cristina Castro**

Servicio de Nefrología. Hospital Dr. Peset. Valencia

NefroPlus 2024;16(1):30

© 2024 Sociedad Española de Nefrología. Servicios de edición de Elsevier España S.L.U.



REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- Collins MG, Fahim MA, Pascoe EM, Hawley CM, Johnson DW, Varghese J, Hickey LE, Clayton PA, Dansie KB, McConnochie RC, Vergara LA, Kiriwandeniya C, Reidlinger D, Mount PF, Weinberg L, McArthur CJ, Coates PT, Endre ZH, Goodman D, Howard K, Howell M, Jamboti JS, Kanellis J, Laurence JM, Lim WH, McTaggart SJ, O'Connell PJ, Pilmore HL, Wong G, Chadban SJ; BEST-Fluids Investigators; Australasian Kidney Trials Network. Balanced crystalloid solution versus saline in deceased donor kidney transplantation (BEST-Fluids): a pragmatic, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet. 2023 Jul 8;402(10396):105-117. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)00642-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00642-6)